

## Cidely Top



# Cidely Top

Ultima actualizare:

30.03.2020

## Fungicid

### Produs protecția plantelor

**Ambalaj:**

1 litru

**Compoziție:**

125 g/l

difenoconazol

15 g/l

ciflufenamid

Familia Chimică:

Triazoli

Amidoxime

**Formulare:**

concentrat dispersabil

**Mod de acțiune:**

sistemic, translaminar

Cidely Top este un fungicid foliar translaminar cu acțiune preventivă împotriva făinării și bolilor foliare la legume și căpșun. Conține două substanțe active cu acțiune complementară: difenoconazol și ciflufenamid. Ciflufenamid singurul reprezentant al unei noi clase de compuși chimici, amidoximele acționează asupra a 3 stadii de dezvoltare a ciupercilor patogene: inhibarea formării de haustori, asupra dezvoltării miceliilor și asupra sporulării. Prezintă o excelentă acțiune preventivă, dar și curativă. Difenoconazol acționează împotriva ciupercilor în momentul penetrării în plantă (germinării sporilor ciupercii) și în perioada de formare a haustorilor și oprește dezvoltarea ciupercilor patogene prin interferarea în procesul de biosinteză a sterolilor (ergosterol) din membranele celulare.

Cidely Top este un fungicid cu spectru larg în combaterea bolilor foliare la familiile de Solanaceae, Cucurbitaceae și arbuști fructiferi, având un control excelent împotriva făinării și pătărilor de frunză.

## Product CP: Tabs

- [Omologări](#)
- [Clasificare și Securitate](#)
- [Sfaturi de aplicare](#)
- [Contacte în caz de urgențe](#)

## [Omologări](#)

### [Cidely Top Ardei câmp, sere și solarii](#)

Ardei câmp, sere și solarii

#### Alternarioza (Alternaria solani)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m

**Perioada de utilizare:** de la 10 frunze formate până la pârgă

#### Făinare (Leveillula taurica)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m

**Perioada de utilizare:** de la 10 frunze formate până la pârgă

#### Pătarea cafenie (Cladosporium spp.)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m
<b>Perioada de utilizare:</b>	de la 10 frunze formate până la pârgă			

## Cidely Top Căpșuni câmp, sere și solarii

Căpșuni câmp, sere și solarii

### Alternarioza (*Alternaria* spp.)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m
<b>Perioada de utilizare:</b>	de la 10 frunze formate și până la a doua recoltare a fructelor mature			

### Antracnoză (*Colletotrichum acutatum*)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m
<b>Perioada de utilizare:</b>	de la 10 frunze formate și până la a doua recoltare a fructelor mature			

### Făinare (*Podosphaera macularis*)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m
<b>Perioada de utilizare:</b>	de la 10 frunze formate și până la a doua recoltare a fructelor mature			

## Pătarea albă (*Mycosphaerella fragariae*)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m
<b>Perioada de utilizare:</b>	de la 10 frunze formate și până la a doua recoltare a fructelor mature			

## Cidely Top Castraveți câmp, sere și solarii

Castraveți câmp, sere și solarii

### Alternarioza (*Alternaria cucumerina*)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m
<b>Perioada de utilizare:</b>	de la 20 frunze formate și până la maturaritatea frunzelor			

### Antracnoza cucurbitaceelor (*Colletotrichum lagenarium*)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m
<b>Perioada de utilizare:</b>	de la 20 frunze formate și până la maturaritatea frunzelor			

### Făinare (*Erysiphe cichoracearum*)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m

**Perioada de utilizare:** de la 20 frunze formate și până la maturaritatea frunzelor

---

### Făinare (Podospaera xanthii)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m

**Perioada de utilizare:** de la 20 frunze formate și până la maturaritatea frunzelor

---

### Pătarea brună a cucurbitaceelor (Didymella bryoniae)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m

**Perioada de utilizare:** de la 20 frunze formate și până la maturaritatea frunzelor

---

### Pătarea cafenie (Cladosporium cucumerinum)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m

**Perioada de utilizare:** de la 20 frunze formate și până la maturaritatea frunzelor

---

## Cidely Top Dovlecei câmp, sere și solarii

Dovlecei câmp, sere și solarii

### Alternarioza (Alternaria cucumerina)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m

**Perioada de utilizare:** de la 20 frunze formate și până la maturaritatea frunzelor

### Alternarioza (*Alternaria cucumerina*)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m

**Perioada de utilizare:** de la 20 frunze formate și până la maturaritatea frunzelor

### Antracnoza cucurbitaceelor (*Colletotrichum lagenarium*)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m

**Perioada de utilizare:** de la 20 frunze formate și până la maturaritatea frunzelor

### Făinare (*Erysiphe cichoracearum*)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m

**Perioada de utilizare:** de la 20 frunze formate și până la maturaritatea frunzelor

### Făinare (*Podosphaera xanthii*)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m

**Perioada de utilizare:** de la 20 frunze formate și până la maturaritatea frunzelor

### Pătarea brună a cucurbitaceelor (*Didymella bryoniae*)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m

**Perioada de utilizare:** de la 20 frunze formate și până la maturaritatea frunzelor

### Pătarea cafenie (*Cladosporium cucumerinum*)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m

**Perioada de utilizare:** de la 20 frunze formate și până la maturaritatea frunzelor

## Cidely Top Pepeni galbeni câmp, sere și solarii

Pepeni galbeni câmp, sere și solarii

### Alternarioza (*Alternaria cucumerina*)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m

**Perioada de utilizare:** de la 20 frunze formate și până la maturaritatea frunzelor

## Antracnoza cucurbitaceelor (*Colletotrichum lagenarium*)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m

**Perioada de utilizare:** de la 20 frunze formate și până la maturaritatea frunzelor

## Făinare (*Erysiphe cichoracearum*)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m

**Perioada de utilizare:** de la 20 frunze formate și până la maturaritatea frunzelor

## Făinare (*Podosphaera xanthii*)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m

**Perioada de utilizare:** de la 20 frunze formate și până la maturaritatea frunzelor

## Pătarea brună a cucurbitaceelor (*Didymella bryoniae*)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m

**Perioada de utilizare:** de la 20 frunze formate și până la maturaritatea frunzelor



## Pătarea cafenie (Cladosporium cucumerinum)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m

**Perioada de utilizare:** de la 20 frunze formate și până la maturaritatea frunzelor

## Cidely Top Pepeni verzi câmp, sere și solarii

Pepeni verzi câmp, sere și solarii

### Alternarioza (Alternaria cucumerina)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m

**Perioada de utilizare:** de la 20 frunze formate și până la maturaritatea frunzelor

### Antracnoza cucurbitaceelor (Colletotrichum lagenarium)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m

**Perioada de utilizare:** de la 20 frunze formate și până la maturaritatea frunzelor

### Făinare (Erysiphe cichoracearum)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m

**Perioada de utilizare:** de la 20 frunze formate și până la maturaritatea frunzelor

utilizare:

---

### Făinare (Podosphaera xanthii)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m

**Perioada de utilizare:** de la 20 frunze formate și până la maturaritatea frunzelor

---

### Pătarea brună a cucurbitaceelor (Didymella bryoniae)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m

**Perioada de utilizare:** de la 20 frunze formate și până la maturaritatea frunzelor

---

### Pătarea cafenie (Cladosporium cucumerinum)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m

**Perioada de utilizare:** de la 20 frunze formate și până la maturaritatea frunzelor

---

## Cidely Top Tomate câmp, sere și solarii

Tomate câmp, sere și solarii

### Alternarioza (Alternaria solani)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m

**Perioada de utilizare:** de la 10 frunze formate până la pârgă

### Făinare (Erysiphe lycopersici)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m

**Perioada de utilizare:** de la 10 frunze formate până la pârgă

### Făinare (Leveillula taurica)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m

**Perioada de utilizare:** de la 10 frunze formate până la pârgă

### Pătarea cafenie (Fulvia fulva)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89

**Perioada de utilizare:** de la 10 frunze formate până la pârgă

## Cidely Top Vinete câmp, sere și solarii

Vinete câmp, sere și solarii

## Alternarioza (*Alternaria solani*)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m

**Perioada de utilizare:** de la 10 frunze formate până la pârgă

---

## Făinare (*Leveillula taurica*)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m

**Perioada de utilizare:** de la 10 frunze formate până la pârgă

---

## Pătarea cafenie (*Cladosporium spp.*)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH20-89	3 zile	15 m

**Perioada de utilizare:** de la 10 frunze formate până la pârgă

---

## Clasificare și Securitate

<b>Clasificare</b>	PERICOL
<b>Fraze de pericol</b>	• H318, H410, EUH401

## Fraze de precauție

- P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- P273: Evitați dispersarea în mediu.
- P280: Purtați mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
- P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P310: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
- P391: Colectați scurgerile de produs.
- P501: Aruncați conținutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.

## Măsurile de igienă și protecție a muncii

- A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție, nu se bea nu se mănâncă și nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile și fața cu multă apă și săpun fără a se freca.

## Alte restricții de utilizare

Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafață. Nu contaminați apa pentru irigații sau de uz menajer și nici eleșteele, șanțurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile.

Nu contaminați apa, alimentele, furajele, semințele sau ambalajele acestora.

Nu împrăștiati produsul în apropierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.

Respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafață.

## Sfaturi de aplicare

### Compatibilitate

Cidely Top este compatibil cu foarte multe produse de protecția plantelor și îngrășăminte uzuale. NU este compatibil cu produsele alcaline cum ar fi zeama bordeleză. Pentru o folosire corectă a produsului, înainte de amestecarea CCidely Top cu orice alt produs de protecția plantelor sau îngrășământ, trebuie să consultați tabelele de compatibilități și să efectuați un test pe cultura respectivă.

### Pregătirea soluției

Se introduce cantitatea măsurată de produs în rezervorul pe jumătate plin cu apă. Se completează cu restul de apă. În timpul amestecării și aplicării, se agită bine pentru a menține emulsia uniformă. Volumul de apă corespunzător culturii și volumul foliar de stropit se va corela cu volumul cu soluție de aplicare.

### Volum apă

300-1000 litri apă/ ha

## **Contacte în caz de urgențe**

- Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, București - Serviciul de Urgență: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

Centru de informare toxicologică: Institutul Național de Sănătate Publică, București, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00

---