

Score 250EC



Score 250EC

Ultima actualizare:

02.03.2021

Fungicid

Produs protecția plantelor

Ambalaj:

250 ml și microambalaje

Compoziție:

250 g/l

difenoconazol

Familia Chimică:

Triazoli

Formulare:

concentrat emulsionabil

Mod de acțiune:

preventiv, curativ, sistemic, translaminar

Score este un fungicid sistemic cu preluare rapidă în plantă. Substanța activă acționează împotriva ciupercilor în momentul penetrării în plantă (germinării sporilor ciupercii) și în perioada de formare a haustoriilor. Score oprește dezvoltarea ciupercilor patogene prin interferarea în procesul de biosinteză a sterolilor (ergosterol) din membranele celulare. Produsul este transportat sistemic, acropetal, ascendent prin vasele lemnoase în toate părțile verzi ale plantei. Pe frunze este distribuit translaminar pe ambele fețe, asigurând astfel, o protecție uniformă foarte bună împotriva bolilor. Deși modul de acțiune permite utilizarea preventivă și curativă, se recomandă aplicarea produsului preventiv pentru a evita infestarea ireversibilă a culturii.

Score 250 EC este fungicid sistemic pentru combaterea bolilor la sfecla de zahăr și alte culturi. Produsul are acțiune preventivă și curativă prin blocarea dezvoltării bolilor în interiorul plantelor. Score poate fi folosit la o gamă largă de culturi și are o fereastră largă de aplicare.

Product CP: Tabs

- [Omologări](#)
- [Clasificare și Securitate](#)
- [Sfaturi de aplicare](#)
- [Contacte în caz de urgențe](#)

[Omologări](#)

[Score 250EC Cais](#)

Cais

Monilioză (Monilinia laxa)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
0.15 l/ha (0.015%)	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 12 zile	1-ul tratament de la BBCH60, al 2-lea până la 7 zile înainte de recoltare	7 zile	15 m

[Score 250EC Căpșun](#)

Căpșun

Pătarea albă (Mycosphaerella fragariae)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
0.3 l/ha (0.03%)	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 12 zile	BBCH 60-89	3 zile	15 m

Score 250EC Cireș

Cireș

Monilioză (Monilinia spp.)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
0.2 l/ha (0.02%)	3 - intervalul minim dintre tratamente este de 7 zile	BBCH 60-85	14 zile	15 m

Pătarea frunzelor (Blumeriella jaapii)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
0.2 l/ha (0.02%)	3 - intervalul minim dintre tratamente este de 7 zile	BBCH 60-85	14 zile	15 m

Score 250EC Măr

Măr

Făinare (Podospaera leucotricha)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
0.200 l/ha (0.2267%)	3 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH 61-84 începutul înfloririi	28 zile	15 m

Stadiul de utilizare: se aplică preventiv sau curativ

Rapăn (Venturia inaequalis)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
0.200 l/ha (0.2267%)	3 - intervalul minim dintre tratamente este de 10 zile	BBCH 61-84 începutul înfloririi	28 zile	15 m

Stadiul de utilizare: se aplică preventiv sau curativ

Score 250EC Piersic

Piersic

Bășicarea frunzelor (*Taphrina deformans*)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
0.2 l/ha (0.02%)	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 7 zile	BBCH 60 - până la 7 zile înainte de recoltare	7 zile	15 m

Ciuruirea frunzelor (*Coryneum beijerinckii*)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
0.2 l/ha (0.02%)	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 7 zile	BBCH 60 - până la 7 zile înainte de recoltare	7 zile	15 m

Făinare (*Sphaerotheca pannosa* var. *persicae*)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
0.2 l/ha (0.02%)	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 7 zile	BBCH 60 - până la 7 zile înainte de recoltare	7 zile	15 m

Monilioză (*Monilinia laxa*)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
0.15 l/ha (0.015%)	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 7 zile	BBCH 60 - până la 7 zile înainte de recoltare	7 zile	15 m

Monilioză (*Monilinia* spp.)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
0.2 l/ha (0.02%)	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 7 zile	BBCH 60 - până la 7 zile înainte de recoltare	7 zile	15 m

Score 250EC Rapiță pentru ulei

Rapiță pentru ulei

Făinare (Erysiphe communis)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
0.5 l/ha	1 aplicare în toamnă + 1 aplicare în primăvară	Toamna BBCH 11-18, Primăvara BBCH 31-55	3 zile	15 m

Putregaiul uscat (Phoma lingam)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
0.5 l/ha	1 aplicare în toamnă + 1 aplicare în primăvară	Toamna BBCH 11-18, Primăvara BBCH 31-55	3 zile	15 m

Pătarea neagră a frunzelor (Alternaria brassicae)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
0.5 l/ha	1 aplicare în toamnă + 1 aplicare în primăvară	Toamna BBCH 11-18, Primăvara BBCH 31-55	3 zile	15 m

Score 250EC Sfeclă de zahăr

Sfeclă de zahăr

Cercosporioză (Cercospora beticola)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
0.3 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 21 zile	BBCH 31-49	28 zile	15 m

Stadiul de utilizare: la apariția primelor simptome de instalare a bolii
Restricții de utilizare: nu se recomandă amestecurile cu produse cuprice

Făinare (Erysiphe betae)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
0.3 l/ha	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 21 zile	BBCH 31-49	28 zile	15 m

Stadiul de utilizare: la apariția primelor simptome de instalare a bolii
Restricții de utilizare: nu se recomandă amestecurile cu produse cuprice

Score 250EC Tomate

Tomate

Alternarioza (Alternaria solani)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
0.5 l/ha (0.05%)	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 7 zile	BBCH 20-87	7 zile	15 m

Score 250EC Vișin

Vișin

Monilioză (Monilinia laxa)

Doza recomandată	Nr. maxim de aplicări	Perioada de aplicare (BBCH)	Timp de pauză până la recoltare	Zona tampon până la apa de suprafață
0.15 l/ha (0.015%)	2 - intervalul minim dintre tratamente este de 12 zile	BBCH 60-85	7 zile	15 m

Clasificare și Securitate

Clasificare	PERICOL
Fraze de pericol	<ul style="list-style-type: none">• H304, H319, H410, EUH066, EUH401
Fraze de precauție	<ul style="list-style-type: none">• P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.• P273: Evitați eliminarea în mediu.• P280: Purtați mănuși de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.• P301+P310: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.• P331: NU provocați vomă.• P337+P313: Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.• P391: Colectați scurgerile de produs.• P501: Aruncați conținutul/ recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.
Măsuri de igienă și protecție a muncii	<ul style="list-style-type: none">• În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție, nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile și fața cu multă apă și săpun fără a se freca. Pentru reducerea expunerii operatorului se va purta echipament de protecție: salopetă, șorț, cizme de cauciuc sau ghete, mănuși din cauciuc nitril, ochelari și mască de protecție. Purtați mănuși rezistente la acțiunea agenților chimici. Mănușile pe care le purtați trebuie să fie în conformitate cu standardele reglementate. Purtați mănuși cu rezistența cerută de durata expunerii. Nivelul de rezistență al acestora variază în funcție de densitatea materialului, tipul de material folosit, precum și de producător. Schimbați mănușile în cazul degradării sau penetrării chimice. Material adecvat: cauciuc de nitril.
Alte restricții de utilizare	<p>Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafață. Nu contaminați apa pentru irigații sau de uz menajer și nici eleșteele, șanțurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile. Nu contaminați apa, alimentele, furajele, semințele sau ambalajele acestora. Nu împrăștiati produsul în apropierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.</p> <p>Respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafață.</p>

Sfaturi de aplicare

Compatibilitate

Score este compatibil cu numeroase produse de uz fitosanitar. Nu se recomandă însă amestecurile cu produse cuprice. Înainte de utilizare se vor consulta tabelele cu compatibilități și se va efectua un test pe cultura respectivă.

Pregătirea soluției

Se introduce cantitatea măsurată de produs în rezervorul pe jumătate plin cu apă. Se completează cu restul de apă. În timpul amestecării și aplicării, se agită bine pentru a menține emulsia uniformă.

Volum apă

100-500 litri /ha la rapiță pentru ulei, sfeclă de zahăr

750 litri /ha la măr

1000 litri /ha la cais, căpșun, cireș, piersic, vișin, tomate

Contacte în caz de urgențe

- Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, București - Serviciul de Urgență: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

Centru de informare toxicologică: Institutul Național de Sănătate Publică, București, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00
