

Ampligo



Ampligo

Ultima actualizare:

23.11.2021

Insecticid

Produs protecția plantelor

Ambalaj:

1L

Compoziție:

50 g/l (4,63% g/g)

lambda-cihalotrin

100 g/l (9,26% g/g)

clorantraniliprol

Familia Chemică:

Piretroizi

Antranilamide

Mod de acțiune:

sistemic locală (translaminar sau penetrant) și de contact

Clorantraniliprol acționează ca modulator al receptorului ryanodinei. Modul de acțiune se manifestă prin activarea receptorilor ryanodinei care stimulează eliberarea calciului depozitat în mușchii netezi și striati, cauzând dereglarea sistemului muscular, paralizie și în final moartea insectelor.

Lambda-cihalotrin este un piretroid de sinteză performant, cu acțiune de contact rapidă și de șoc asupra insectelor. După aplicare, substanța activă penetrează rapid cuticula insectei acționând asupra sistemului nervos, dăunătorii încetează să se hrănească, după care paralizează și mor repede.

Ampligo® este un insecticid cu spectru larg de acțiune care are în compoziție două substanțe active (clorantraniliprol și lambda-cihalotrin) cu moduri diferite de acțiune asupra dăunătorilor din grupa bisamide și piretroide.

Product CP: Tabs

- [Omologări](#)
- [Clasificare și Securitate](#)
- [Sfaturi de aplicare](#)
- [Contacte în caz de urgențe](#)

Cultură

- Oricare - ▼

Apply

Broccoli (câmp)

Conopidă (câmp)

Porumb

Porumb dulce

Varză (câmp)

Clasificare

ATENȚIE

Fraze de pericol

• H302 + H332

Fraze de precauție

- P261: Evitați să inspirați praful/ fumul/ gazul/ ceața/ vaporii/ spray-ul.
- P264: Spălați-vă mâinile bine după utilizare.
- P273: Evitați dispersarea în mediu.
- P304 + P340 + P312: ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.
- P391: Colectați scurgerile de produs.
- P501: Aruncați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.
- EUH 208: Conține 1,2-benzisotiazol-3-onă. Risc de reacție alergică.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

- Produsul nu se va lăsa la îndemâna copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide sau care alăptează, bătrânilor și altor persoane neautorizate și în zonele de acces al animalelor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semințele și ambalajele acestora. A nu se împrăști produsul în apropierea surselor de apă sau pe alte culturi decât cea recomandată. A se evita contactul produsului concentrat cu ochii, pielea și hainele (părțile contaminate se vor spăla imediat cu apă și săpun fără a se freca). Nu se vor consuma alimente sau lichide și nu se va fuma în timpul utilizării. Nu se vor inhala vaporii sau ceața de pulverizare în timpul tratamentului. În timpul lucrului se poartă echipament de protecție corespunzător (salopetă, cizme și mască). În timpul manipulării produsului concentrat, se vor purta mănuși impermeabile, șorț de cauciuc, vizieră sau ochelari de protecție. După lucru, se vor spăla hainele (separat de celelalte obișnuite) și întreg corpul cu apă și săpun.

Alte restricții de utilizare

- SP1 - A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)
- SPe3 - Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apa de suprafață
- SPe8 - PERICULOS PENTRU ALBINE! Pentru a proteja albinele și alte insecte polenizatoare nu aplicați pe plante în timpul înfloritului. Nu utilizați produsul în timpul sezonului activ al albinelor! Îndepărtați sau acoperiți stupii în timpul aplicării și 24 de ore după tratament.

Compatibilitate

Ampligo® este compatibil cu numeroase produse de protecția plantelor. Înainte de utilizare se vor consulta tabelele cu compatibilități și efectuați un test pe cultura respectivă.

Pregătirea soluției

Echipamentul trebuie să fie curat și calibrat corespunzător.

- Se adaugă în rezervor jumătate din cantitatea de apă necesară, se pornește sistemul de agitare și se adaugă cantitatea măsurată de Ampligo®.
- Se completează cu restul de apă.
- Se menține sistemul de agitare în funcțiune pe toată durata tratamentului. Când se folosește în amestec cu un alt produs, se verifică mai întâi compatibilitatea cu produsul respectiv, după care se va adăuga în rezervor Ampligo® și apoi partenerul de amestec. În cazul în care partenerul de amestec este sub formă de plicuri hidrosolubile, se adaugă întâi acest produs și apoi Ampligo®. Cantitatea de soluție folosită este în funcție de cultură și stadiul de vegetație. Se va folosi un volum de soluție suficient de mare pentru a asigura o bună acoperire a foliajului cu soluția de stropit, dar se va evita șiroirea.

Volum apă

Porumb, Porumb dulce: 300-600 litri/ ha

Varză (câmp), Conopidă (câmp), Broccoli (câmp): 200-1000 litri

- Telefon urgențe: Syngenta Agro SRL, București - Serviciul de Urgență: Tel.: +(40 21) 529 25 77 sau

Centru de informare toxicologică: Institutul Național de Sănătate Publică, București, Tel: +40 21 3183606 sau +40 21 3183620, interior 235, orar: luni - vineri între orele 8.00 - 15.00
