Amistar® Era Pack

syngenta®

DESCRIEREA PACHETULUI AMISTAR ERA

Este alcătuit din 2 fungicide (Amistar® și Era). Cele 2 fungicide au un efect complementar și controlează majoritatea bolilor din culturile de cereale.

- **Amistar®** este un fungicid cu acțiune sistemică locală translaminară pe frunze. Amistar® interferă cu ciclul de viață al agenților patogeni, în principal în timpul germinației sporilor, prin inhibarea mobilității și germinației zoosporilor (reduce riscul infecțiilor secundare). Substanța activă azoxistrobin este preluată gradual în frunze.
- **Era** este un fungicid sistemic din grupa triazolilor. Este destinat combaterii bolilor la cereale și rapiță. Se aplică în timpul vegetației preventiv sau când patogenii țintă s-au instalat în cultură. Produsul este preluat prin frunze și translocat acropetal și la nivelul noilor creșteri.

Ordinea de realizare a amestecului și prepararea soluției de stropit

- Umpleți rezervorul cu ½ din volumul de apă în rezervorul curat
- Porniți agitatorul la viteză medie
- Adăugați Amistar® și amestecați continuu între 3 și 5 minute
- Adăugați Era și amestecați continuu
- Adaugați restul de apă și amestecați

Pachetul este dimensionat pentru 20 de hectare și cuprinde: 3x5L Amistar®, 3x1L de Era și 1x5L de Era.
Recomandări de utilizare a pachetului tehnologic **AMISTAR ERA**:

Amistar®

Cultura	Agentul dăunător	Doza	Perioada de aplicare	Nr. max. de tratamente (interval - zile)	Volumul de apă la hectar (litri)	Timp de pauză până la recoltare (zile)
Grâu	*Erysiphe graminis, Pyrenophora tritici-repenti, Puccinia recondita, Septoria tritici, Septoria nodorum, Fusarium spp., Alternaria spp.,*	0,75-1 l/ha (în funcție de gradul de infecție)	Se aplică de la începutul alungirii paiului, până la sfârșitul înfloritului (BBCH 30-69)	2 (14)	200-300	35
Orz	*Erysiphe graminis, Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis, Puccinia hordei, Fusarium spp.*	0,75-1 l/ha (în funcție de gradul de infecție)	Se aplică de la începutul alungirii paiului, până la sfârșitul perioadei de înspicare / spicul este complet vizibil (BBCH 30-59)	2 (14)	200-300	35
Secară	*Puccinia recondita, Rhynchosporium secalis*	0,75-1 l/ha (în funcție de gradul de infecție)	Se aplică de la începutul alungirii paiului, până la sfârșitul înfloritului (BBCH 30-69)	2 (14)	200-300	35
Triticale	*Erysiphe graminis Puccinia recondita, Rhynchosporium secalis, Pyrenophora tritici-repenti, Septoria tritici, Septoria nodorum, Fusarium spp.*	0,75-1 l/ha (în funcție de gradul de infecție)	Se aplică de la începutul alungirii paiului, până la sfârșitul înfloritului (BBCH 30-69)	2 (14)	200-300	35
Rapiță	*Alternaria brassicae, Sclerotinia sclerotiorum, Leptosphaeria maculans (Phoma lingam), Botrytis cinerea*	0,75-1 l/ha (în funcție de gradul de infecție)	Se aplică de la începutul înfloritului, până la sfârșitul perioadei de înflorit (BBCH 60-69)	2 (21)	200-500	21

Era

Cultura	Agentul dăunător	Doza
Grâu de toamnă și primăvară	*Septoria tritici syn. Zymoseptoria tritici* (Septorioza frunzelor), *Septoria nodorum* (Septorioza spicelor), *Puccinia striiformis* (Rugina galbenă), *Puccinia recondita* (Rugina brună), *Pyrenophora tritici-repentis* (Silpirea frunzelor), *Blumeria graminis* (Făinare)	0,33-0,65* L/ha Se aplică maxim 2 tratamente/sezon cu un interval de minim 14 zile între tratamente de la sfârșitul fazei de înfrățire până la începutul înfloririi (BBCH 29-61). (* în cazul unui grad de infestare mai scăzut se recomandă doza mai mică, iar în cazul unei infestări puternice și atunci când sunt prezente mai multe boli, doza mai mare)
	Fusarium sp. (Fuzarioza)	0,33-0,65* L/ha Se aplică maxim 1 tratament/sezon de la apariția primelor spice până la sfârșitul înfloritului (BBCH 61-69). (* în cazul unui grad de infestare mai scăzut se recomandă doza mai mică, iar în cazul unei infestări puternice și atunci când sunt prezente mai multe boli, doza mai mare)
Orz de toamnă și primăvară	*Puccinia hordei* (Rugina), *Pyrenophora teres* (Pătarea reticulară), *Rhynchosporium secalis* (Arsura frunzelor), *Blumeria graminis* (Făinarea)	0,33-0,65* L/ha Se aplică maxim 2 tratamente/sezon cu un interval de minim 14 zile între tratamente de la sfârșitul fazei de înfrățire până la începutul înfloririi (BBCH 29-61). (* în cazul unui grad de infestare mai scăzut se recomandă doza mai mică, iar în cazul unei infestări puternice și atunci când sunt prezente mai multe boli, doza mai mare)
Secară de toamnă	Rhynchosporium secalis (Arsura frunzelor), Puccinia recondita (Rugina brună), Blumeria graminis (Făinarea)	0,33-0,65* L/ha Se aplică maxim 2 tratamente/sezon cu un interval de minim 14 zile între tratamente de la sfârșitul fazei de înfrățire până la începutul înfloririi (BBCH 29-61). (* în cazul unui grad de infestare mai scăzut se recomandă doza mai mică, iar în cazul unei infestări puternice și atunci când sunt prezente mai multe boli, doza mai mare)
Triticale de toamnă	*Rhynchosporium secalis* (Arsura frunzelor), *Septoria nodorum* (Septorioza spicelor), *Puccinia striiformis* (Rugina galbenă), *Septoria tritici* (Septorioza frunzelor), *Blumeria graminis* (Făinare)	0,33-0,65* L/ha Se aplică maxim 2 tratamente/sezon cu un interval de minim 14 zile între tratamente de la sfârșitul fazei de înfrățire până la începutul înfloririi (BBCH 29-61). (* în cazul unui grad de infestare mai scăzut se recomandă doza mai mică, iar în cazul unei infestări puternice și atunci când sunt prezente mai multe boli, doza mai mare)
	Fusarium sp. (Fuzarioza)	0,33-0,65* L/ha Se aplică maxim 1 tratament/sezon de la apariția primelor spice până la sfârșitul înfloritului (BBCH 61-69). (* în cazul unui grad de infestare mai scăzut se recomandă doza mai mică, iar în cazul unei infestări puternice și atunci când sunt prezente mai multe boli, doza mai mare)
Rapiță de toamnă	*Phoma lingam* (Putregaiul negru), *Sclerotinia sp.* (Putregaiul alb), *Alternaria sp.* (Alternarioza)	0,3-0,6* L/ha Se aplică maxim 2 tratamente în toamnă, în fenofaza de 6-9 frunze (BBCH 16-19) sau în primăvara de la începutul vegetației până la apariția primelor petale (BBCH 58). Se va aplica un tratament în toamnă și unul în primăvara sau ambele tratamente în primăvară (interval dintre tratamentul de toamnă și tratamentul de primăvară este cel puțin 86 de zile, iar intervalul dintre tratamentele de primăvară este de 21 zile) (* în cazul unui grad de infestare mai scăzut se recomandă doză mai mică, iar în cazul unei infestări puternice și atunci când sunt prezente mai multe boli, doza mai mare)
Rapiță de primăvară	*Phoma lingam* (Putregaiul negru), *Sclerotinia sp.* (Putregaiul alb), *Alternaria sp.* (Alternarioza)	0,3-0,6* L/ha Se aplică maxim 1 tratament de la faza de 6 frunze până la apariția primelor petale (BBCH 16-59) (* în cazul unui grad de infestare mai scăzut se recomanda doză mai mică, iar în cazul unei infestări puternice și atunci când sunt prezente mai multe boli, doza mai mare)

Numele produselor marcate cu ® sau ™, sigla SYNGENTA, și elementele alăturate sunt mărci ale unor companii din grupul Syngenta

3x5L + 3x1L +1x5L

SCAPA

™